Конструктор индивидуальных заданий по математике SCHOOL-PRO.RU

Комплект заданий по математике в этом файле был автоматически сгенерирован в Конструкторе.

В Конструкторе также можно генерировать карточки и комплекты КИМов ОГЭ, ЕГЭпроф, ЕГЭбаз, ВПР-5-6-7-8 пачками до 40 штук сразу за 2 минуты!

Конструктор позволяет круглый год задавать индивидуальные домашние задания по математике для учеников 5-8 классов, а также по темам ОГЭ и ЕГЭ. Также в Конструкторе есть генератор КИМов, который позволяет создавать экзаменационные КИМы «пачками» в один клик. Все задания и ответы к ним генерируются умными программами-скриптами автоматически, поэтому **задания и ответы будут только у Вас и нигде больше в Интернете!**

То есть, Вы можете самостоятельно генерировать файлы, похожие на этот, в Конструкторе – с уникальными заданиями и ответами, которые будут только у Вас и нигде больше!

Узнайте, как использовать Конструктор на полную мощность:

- Конструктор индивидуальных заданий
- Краткая видеоинструкция по Конструктору (2 минуты): смотреть
- Полная видео-и текстовая инструкция по Конструктору: смотреть (желательно за компьютером)
- Видеоинструкция (частично устаревшая): смотреть
- Краткая инструкция по Конструктору в картинках: смотреть
- Вступайте в нашу группу ВК: Конструктор индивидуальных заданий (группа ВК)
- По всем вопросам пишите автору и администратору Конструктора Максиму Семенихину (страничка ВК)

Вариант 2

© school-pro.ru - подготовка к ЕГЭ и ОГЭ по математике

1. Каждому из четырёх неравенств в левом столбце соответствует одно из решений в правом столбце. Установите соответствие между неравенствами и их решениями.

А) $2^x < 16$
Б) $2^x > 16$
В) $0.5^x < 16$
Г) $0.5^x > 16$

1) $x < 4$
2) $x > -4$
3) $x > 4$
4) $x < -4$

А	Б	В	Г

2. Каждому из четырёх неравенств в левом столбце соответствует одно из решений в правом столбце. Установите соответствие между неравенствами и их решениями.

А) $5^x \le 25$
Б) $5^x \ge 25$
В) $0.2^x \le 25$
Г) $0.2^x \ge 25$

1) $[2; +\infty)$
2) $(-\infty; -2]$
3) $[-2; +\infty)$
4) $(-\infty; 2]$

А	Б	В	Г

3. Каждому из четырёх неравенств в левом столбце соответствует одно из решений в правом столбце. Установите соответствие между неравенствами и их решениями.

А) $2^x \ge 1$
Б) $(\frac{1}{16})^x \le 2$
В) $2^x \le 1$
Г) $(\frac{1}{16})^x \ge 2$

1) $[0; +\infty)$
2) $[-0.25; +\infty)$
3) $(-\infty; 0]$
4) $(-\infty; -0.25]$

А	Б	В	Г

4. Каждому из четырёх неравенств в левом столбце соответствует одно из решений в правом столбце. Установите соответствие между неравенствами и их решениями.

А) $(\frac{1}{6})^x \ge 36$
Б) $(\frac{1}{6})^x \le 36$
В) $6^x \ge 36$
Г) $6^x \le 36$

1) 

2) 

3) 

4) 

А	Б	В	Г

Вариант 2

© school-pro.ru - подготовка к ЕГЭ и ОГЭ по математике

1. Каждому из четырёх неравенств в левом столбце соответствует одно из решений в правом столбце. Установите соответствие между неравенствами и их решениями.

А) $2^x < 16$
Б) $2^x > 16$
В) $0.5^x < 16$
Г) $0.5^x > 16$

1) $x < 4$
2) $x > -4$
3) $x > 4$
4) $x < -4$

А	Б	В	Г

2. Каждому из четырёх неравенств в левом столбце соответствует одно из решений в правом столбце. Установите соответствие между неравенствами и их решениями.

А) $5^x \le 25$
Б) $5^x \ge 25$
В) $0.2^x \le 25$
Г) $0.2^x \ge 25$

1) $[2; +\infty)$
2) $(-\infty; -2]$
3) $[-2; +\infty)$
4) $(-\infty; 2]$

А	Б	В	Г

3. Каждому из четырёх неравенств в левом столбце соответствует одно из решений в правом столбце. Установите соответствие между неравенствами и их решениями.

А) $2^x \ge 1$
Б) $(\frac{1}{16})^x \le 2$
В) $2^x \le 1$
Г) $(\frac{1}{16})^x \ge 2$

1) $[0; +\infty)$
2) $[-0.25; +\infty)$
3) $(-\infty; 0]$
4) $(-\infty; -0.25]$

А	Б	В	Г

4. Каждому из четырёх неравенств в левом столбце соответствует одно из решений в правом столбце. Установите соответствие между неравенствами и их решениями.

А) $(\frac{1}{6})^x \ge 36$
Б) $(\frac{1}{6})^x \le 36$
В) $6^x \ge 36$
Г) $6^x \le 36$

1) 

2) 

3) 

4) 

А	Б	В	Г